

	Didžioji zylė (<i>Parus major</i>) Zylinių (<i>Paridae</i>) šeima. Kūno ilgis apie 13 cm. Viršugalvis, gerklė ir pagurklis juodi, skruostai balti, sparnai ir uodega melsvi, nugara gelsvai žalia, pilvas geltonas, juostelė per krūtinę ir pilvo vidurį bei pauodegys – juodi. Peri uoksuose ir inkiluose, 1–2 kartus per metus, deda 8–12 baltų, išmargintų rudomis dėmėmis kiaušinių. Lietuvoje dažna.		Šiaurinė pilkoji zylė (<i>Poecile montanus</i>) Zylinių (<i>Paridae</i>) šeima. Apie 12 cm ilgio. Panaši į paprastąją pilkąją zylę, bet juoda kepurėlė labiau nusitęsusi į užpakalį, skruostai ir kaklo šonai balti, ant gerklės juoda dėmė didesnė. Kai sparnas suglaustas, jame matyti šviesus plotas. Uodega apvali. Snapas juodas. Lizdą suka uokse, neaukštai. Deda 7-8 baltus su rausvomis dėmelėmis kiaušinius. Peri 13 dienų. Po 16-19 dienų jaunikliai palieka uokšą. Išveda vieną vadą. Lietuvoje dažna.
	Mėlynoji zylė (<i>Parus caeruleus</i>) Zylinių (<i>Paridae</i>) šeima. Kakta, skruostai ir antakiai balti. Viršugalvis, sparnai ir uodega mėlyni. Sparnai su balta juostele. Kaklo užpakalinėje dalyje balsva dėmė. Apatinė kūno pusė geltona, išilgai krūtinės eina neryški juosva juostelė. Lizdą krauna išpuvusiose drevėse, inkiluose. Deda apie 10 kiaušinių, 1-2 kartus per metus. Peri apie 2 savaites. Lizdą zyliukai palieka 18–19 dienų amžiaus. Lietuvoje dažna.		Europinė kuoduotoji zylė (<i>Lophophanes cristatus / Parus cristatus</i>) Zylinių (<i>Paridae</i>) šeima. Atpažįstamas iš kuoduko. Dydis 11-12 cm. Kūno viršutinė pusė rusvai pilka. Skruostai balsvi. Snapas juodas, kojos rusvos. Lietuvoje dažna, gyvena spygliuočių miškuose. Lizdą krauna uoksuose, kartais inkiluose. Deda 5-7 baltus kiaušinius, išmargintus raudonai rudomis dėmėmis. Peri 15-18 dienų. Jaunikliai lizdą palieka po 19 dienų. Išveda dvi vadas.
	Paprastoji pilkoji zylė (<i>Parus palustris</i>) Zylinių (<i>Paridae</i>) šeima. Nugara, sparnai ir uodega rusvai pilki, viršugalvis juodas. Gerklė juoda, neryškiais pakraščiais. Galvos šonai pilkšvai balti. Apatinė kūno pusė balsva. Gyvena įvairiuose miškuose, peri uoksuose, inkiluose. Deda 7-9 baltus, išmargintus raudonai rudomis dėmelėmis kiaušinius. Peri 14 dienų (gegužės mėn.). Jaunikliai palieka lizdą po 17-19 dienų. Išaugina vieną vadą. Lietuvoje dažna.		Juodoji zylė (<i>Parus ater</i>), porūšis <i>Purus ater ater</i>. Galva juoda. Skruostai ir dėmė pakaušyje balti. Nugarinė dalis melsvai pilka. Uodega tamsiai pilka. Sparnai rusvai pilki su dviem baltomis juostelėmis. Gerklė juoda. Kpilvas balsvas, šonai rusvo atspalvio. Veisimosi periodu Lietuvoje retoka, pagausėja traukimo laikotarpiu. Lizdus krauna žemai esančiuose uoksuose, retai inkiluose. Dėtyje 8–10 kiaušinių. Peri tik patelė, ~15 dienų. Lizde zyliukai išbūna ~18 dienų. Išvedamos dvi vados.
	Eurāzinis kėkštas (<i>Garrulus glandarius</i>) Varninių (<i>Corvidae</i>) šeima. Ilgis apie 35 cm. Rusvai pilkas. Viršugalvis juodai dryžuotas, uodega ir dėmės po akimis juodos, antuodegis baltas. Sparnuose ryškiai mėlyna su juodais dryžiais dėmė. Žemėje šokinėja. Kartais mėgdžioja kitų paukščių balsus. Lietuvoje dažnas. Gyvena mišriuose ir spygliuočių miškuose. Monogamas. Lizdą krauna medžiuose. Deda 5–7 žalsvai melsvus, tankiai rusvai taškuotus kiaušinius. Peri 16–19 dienų.		Eurazinis karklažvirblis (<i>Passer montanus</i>) Žvirbinių (<i>Passeridae</i>) šeima. Kūno ilgis 12,5–14 cm. Nuo naminio žvirblio skiriasi rudu viršugalviu ir dėme ant skruosto. Lietuvoje gausiai paplitęs. Rudenį ir žiemą laikosi pulkais. Gyvena kaimų sodybose, miestų želdiniuose. Lizdą suka drevėse, pastatų plyšiuose, gandrulizdžiuose, inkiluose. Deda 4-6 įvairių spalvų kiaušinius. Peri 13-14 dienų. Kartais išveda dvi vadas.
	Kikilis (<i>Fringilla coelebs</i>) Kikilinių (<i>Fringillidae</i>) šeima. Patino kakta juoda, viršugalvis ir sprandas pilkai mėlyni. Nugara rusva, antuodegis žalsvas. Sparnai juodai rudi su dviem baltomis juostelėmis. Skruostai ir apatinė kūno pusė raudonai rudi, pilvas šviesesnis. Patelės nugarinė pusė rusvai pilka, antuodegis žalias, pilvinė – pilkai ruda. Sako „pink pink“. Lietuvoje dažnas. Gyvena įvairiuose miškuose, parkuose. Deda 4-6 žalsvus ar melsvus kiaušinius, išmargintus rausvais taškais. Peri 13 dienų. Išveda dvi vadas. Jaunikliai lizde išbūna iki 14 dienų.		Šiaurinis kikilis (<i>Fringilla montifringilla</i>) Patino galva, sprandas ir nugara juodi. Juosmuo ir antuodegis balti. Sparne dvi tamsios juostelės. Krūtinė ir plati juostelė pečių srityje oranžinės. Pilvas baltas. Snapas melsvas. Kojos pilkai rausvos. Patelė šviesesnė ir blankesnė negu patinas. Vietoj juodos spalvos vyrauja tamsiai ruda, o vietoj oranžinės - gelsvai rusva. Lietuvoje paprastai aptinkamas traukimo periodu. Pavienių paukščių žiemoja. Peri labai retai. Migrantas. Traukia pajūriu.

	Žaliukė (<i>Chloris chloris</i> arba <i>Carduelis chloris</i>) Kikilinių (<i>Fringillidae</i>) šeima. Ilgis 12–16 cm. Patino viršutinė kūno pusė gelsvai žalia, apatinė geltona, žalio atspalvio. Patelė panaši, bet blankesnių, rusvai gelsvų spalvų. Snapas balsvas, kojos rausvos. Lietuvoje dažnas. Gyvena miškų pakraščiuose, gyvatvorėse, būreliais po 2-3 poras, rudenį didesniais būriais. Lizdą krauna krūmuose. Deda 5-6 melsvai baltus su rudomis dėmelėmis kiaušinius. Peri ~14 dienų. Išaugina dvi vadas. Jaunikliai lizde išbūna ~ 14 dienų. Gyvena apie dešimt metų, seniausi užfiksuoti 13 metų.		Geltonoji starta (<i>Emberiza citrinella</i>) Startinių (<i>Emberizidae</i>) šeima. Patino viršugalvis geltonas, tamsiai dėmėtas, antakiai, skruostai geltoni. Nugara pilkai ruda su juodomis išilginėmis dėmėmis. Juosmuo ir uodega rudi. Gerklė geltona. Krūtinė ruda, pilvas geltonas. Patelė mažiau ryški. Aktyvi tik dieną. Lesa tik nuo žemės. Veisimosi periodu patinas gina užsiimtą teritoriją. Rudenį ir žiemą telkiasi į būrius, pavasarį išsiskirsto. Lizdą suka ant žemės arba neaukštai krūmuose. Per metus 2 dėty po ~ 4 kiaušinius, peri 12–13 dienų. Jaunikliai lizde išbūna apie 16 dienų. Lietuvoje dažna.
	Bukutis (<i>Sitta europaea</i>) Bukutinių (<i>Sittidae</i>) šeima. Kūno ilgis 14 cm. Trumpauodegis, viršutinė kūno dalis melsvai pilka, išilgai galvos per akį eina juodas dryžis. Sparnai ir uodega juodai rusvi. Apatinė kūno dalis balta, šonai rudi. Snapas tiesus. Kojos stiprios, rusvos, riestais nagais. Lietuvoje dažnas. Gyvena miškuose, parkuose, pušynuose. Laipioja kamienais, dažnai tupi žemyn galva. Sėslus, žiemai kaupia maisto atsargas. Žiemą gyvena poromis. Peri drevėse, inkiluose. Landos angą sumažina užlipdydamas seilėmis suvilgytu moliu. Deda 6-8 kiaušinius, peri 14-18 dienų. Jaunikliai lizdą palieka po 22-24 dienų. Išveda vieną vadą. Gyvena kelerius metus, seniausi užfiksuoti 11–12 metų.		Didysis margasis genys (<i>Dendrocopos major</i>) Geninių (<i>Picidae</i>) šeima. Viršugalvis, kaklas, nugara ir antuodegis juodi. Nuo sparno driekiasi juodas dryželis, skruostuose susilieja su juoda juostele, einančia nuo pakaušio link kaklo šonų. Patino pakaušis raudonas, patelės - juodas. Kakta, skruostai ir visa apatinė kūno pusė balta. Pečių srityje dvi didelės baltos dėmės. Juodi sparnai išmarginti baltais skersiniais dryžiais. Pauodegys raudonas. Poromis būna tik perėjimo metu. Peri mišriuose miškuose, žiemą laikosi eglynuose, pušynuose. Kasmet išsikala naują drevę (per ~3 savaites iškala abu poros nariai). Gūžtos nesuka, kiaušinius deda ant pjuvenų. Dėtyje ~ 5 kiaušinius, abu poros nariai juos peri 2 savaites. Lietuvoje dažnas.
	Smilginis strazdas (<i>Turdus pilaris</i>) Strazdinių (<i>Turdidae</i>) šeima. Pakaušis, galva ir antuodegis pilki, viršugalvis dryžuotas. Pečiai, nugara rudos spalvos. Uodega juodai ruda. Krūtinė, pagurklis, gerklė raibi. Kojos šviesiai rudos. Snapas tamsiai rudas, pamatinė dalis geltona. Šuoliuoja dideliais šuoliais. Dažniausiai suka lizdus kolonijomis. Padedą 4–6 žalsvus rudomis dėmelėmis ir brūkšniais margintus kiaušinius. Peri 12–14 dienų. Jaunikliai 13–14 dienų palieka lizdą, bet dar nemoka skraidyti, todėl daug jų žūva. Rudenį gausiais būriais laikosi arčiau sodybų. Daug smilginių strazdų lieka žiemoti.		Vidutinis margasis genys (<i>Dendrocopos medius</i>) Geninių - (<i>Picidae</i>) šeimos paukštis. Mažesnis už didįjį genį. Patino kakta balsva, viršugalvis raudonas. Skruostai balti, be juodų „ūsų“. Nugara juoda, šonuose baltos dėmės. Kūno apatinė dalis palšva ir gelsva, pauodegys rausvas, šonai dryžuoti. Patelės viršugalvyje raudona dėmė mažesnė. Lapuočių miškų gyventojas, žiemą aptinkamas spygliuočių miške. Apsigyvena senose kitų genių drevėse. Monogamai. Deda ~6 kiaušinius, juos ~12 dienų peri abu porelės nariai. Lizde jaunikliai išbūna apie tris savaites. Jaunikliams palikus lizdą, šeima kartu laikosi dar apie 10 dienų, vėliau išsiskiria. Lietuvoje gana retas.
	Juodagalvė sniegė (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) Kikilinių (<i>Fringillidae</i>) šeima. Ilgis 15-17 cm. Patino viršugalvis, aplink snapą ir gerklė juodi, nugara ir pečiai pilki, juosmuo ir antuodegis balti. Sparnai juodi su balta skersine juostele. Uodega juoda. Pilvinė kūno pusė rausvai raudona. Snapas stiprus, juodas. Patelė blankesnė, pilvinė pusė rausvai pilka. Rudenį ir žiemą dažna želdiniuose. Monogamai. Paprastai lizdus suka eglėse. Deda 5–7 kiaušinius, peri ~14 dienų. Jaunikliai lizde išbūna iki 12–18 dienų. Per metus išveda dvi vadas. Gyvena apie 12,6 metų.		Svilikas (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>) Kikilinių (<i>Fringillidae</i>) šeimos paukštis. Kūno ilgis ~18 cm. Patino galva šviesiai ruda. Juostelė aplink snapą, gerklė, sparnai ir uodega juodi. Nugara tamsiai ruda. Ant pečių plati šviesi juosta. Ant sparnų ir uodegos gale baltos dėmės. Pilvinė pusė rausvai pilka, pauodegys baltas. Būdingas masyvus snapas. Patelė blankesnė už patiną, pilko atspalvio. Lizdą suka senų lapuočių miškuose, parkuose, soduose. Deda 3–5 margus kiaušinius, peri 12–13 dienų. 30 d. jaunikliai tampa savarankiški. Lietuvoje negausus.

ŽIEMOS PAUKŠČIAI